

醫

學

三

字

經

醫學三字經卷三

閩吳航陳念祖修園著

男元豹道彪古愚全校

中風方

小續命湯千金中風總方

麻黃去節根人參黃芩川芎白芍

炙草杏仁防已桂枝防風各一錢

附子五分

加生薑三片水二杯半先煎麻黃至二杯
入諸藥煎八分服

古今錄驗續命湯 治中風風痺身體不能自

收持口不言昏冒不知痛處或拘急不能

轉側

方出金匱附方

麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾薑

甘草

各三錢

川芎

一錢五分

杏仁三十

粒

又一粒

錢

取三分之一

水三杯煎一杯溫服當小汗薄覆脊凭几
汗出則愈不汗更服無所禁勿當風並治
但伏不得卧欬逆上氣面目浮腫

三化湯 治熱風中臟大便不通

大黃 羌活 枳殼 各二錢

水二杯煎八分服

稀涎散 治中風口禁並治單蛾雙蛾

巴豆 六枚每枚分兩片

牙皂 三錢切

明礬 一兩

先將礬化開却入二味攪勻待礬枯為末
每用三分吹喉中痰盛者燈心湯下五分
在喉即吐在膈即下

參附湯 元氣暴脫以此方急回其陽可救

十中二

人參

一兩

附子

五錢

水二杯半煎八分服○此湯治腎氣脫○

以人參換白朮名朮附湯治脾氣脫○換

黃耆名耆附湯治衛氣脫○換當歸名歸

附湯治營氣脫

三生飲

治寒風中臟四肢厥冷痰涎上湧

生烏頭

錢二

生南星

錢三

生附子

錢一

木香

分五

生薑

片五

水二杯煎七分○薛氏用人參一兩煎湯

半杯調服

防風通聖散

治熱風卒中而經絡手足

痰癰內而臟腑二便閉塞用此兩解之較
之三化湯較妥亦為類中風實火治法所
用表藥火鬱發之之義也所用下藥益下
抽薪之義也

防風

荊芥

連翹

麻黃

薄荷

川芎

當歸

白芍

白朮

山梔

大黃

芒硝

各五

黃芩

石膏

桔梗

各一

甘草

錢二

滑石

錢三

水二杯加生薑三片煎八分服。○自利去硝黃。○自汗去麻黃加桂枝。○涎嗽加半夏五味。

地黃飲子

治類中風腎虛火不歸源舌強

不能言足廢不能行。○類中風虛火治法。

熟地

山茱肉

遠志

巴戟天

石斛

石菖蒲

五味子

肉蓯蓉

洗

肉桂

麥冬

附子

茯苓

各一錢

加薄荷葉七葉水二杯煎八分服。此方
法在輕煎。不令諸藥之味盡出。其性厚重
以鎮諸逆。其氣味輕清速走清竅也。

補中益氣湯

治勞役飢飽過度致傷元氣

氣虛而風中之。此類中風氣中虛證。更
有七氣上逆亦名氣中。宜越鞠丸之類。

炙耆

二錢

人參

白朮

炒

當歸

各一錢

炙草

陳皮

各五分

升麻

柴胡

各三分

加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

二陳湯 痰飲通劑

陳皮

一錢五分

半夏

茯苓

各三錢

炙草

一錢

加生薑三片水三杯煎七分服○加白朮

一錢蒼朮二錢竹瀝四湯匙生薑汁二湯

匙名加味二陳湯治類中風痰中證亦名

濕中以濕生痰也○加枳實膽南星竹茹

名絛痰湯

加味六君子湯 治中風王道之劑

方見隔食

加麥冬三錢為君附子一錢為使再調入
竹瀝五錢生薑汁二錢以行經絡之痰久
服自愈

資壽解語湯

喻嘉言

治中風脾緩舌強不語半

身不遂與地黃飲子同意但彼重在腎此
重在脾

防風

附子

天麻

棗仁

各一錢

羚羊

肉桂

各八分

羌活

甘草

各五分

水二杯煎八分入竹瀝五錢薑汁二錢五

分服

喻嘉言治腎氣不榮於舌本加枸杞首烏

生地菊花天冬石菖蒲元參

侯氏黑散

金匱

治大風四肢煩重心中惡寒不

足者。外臺治風癱。

菊花

兩四

白朮

防風

各一兩

桔梗

八錢

細辛

茯苓

牡蠣

人參

礬石

當歸

川芎

乾薑

桂枝

各三錢

黃芩

錢五

右十四味杵為散酒服方寸匕

約有八分余每用一

錢五

分日二服溫酒調服忌一切魚肉大蒜

宜常冷食六十日止熱即下矣

風引湯

金匱

除熱癰瘤

治大人風引少小驚

癰瘕瘰癧日數十發

大黃

乾薑

龍骨

各二兩

桂枝

一兩五錢

甘草

牡蠣各一兩

寒水石

赤石脂

滑石

紫英石

白石脂

石膏

各三兩

右十二味研末粗篩以韋布盛之取三指約六七錢零井花水一杯煎七分溫服按乾薑宜減半

附錄中風俗方殺人以示戒

俗傳中風方風症以攻痰為大戒凡人將

死之頃。皆痰聲漉漉。不獨中風一症。元陽無主。一身之津血俱化為痰。欲攻盡其痰。是欲攻盡其津血也。故錄此以為戒。

膽南星

寒厥火傷胃氣。且能引痰入於心。

尚輕若九製。

枳殼

暫耗散元氣。痰盛得此。

則為害愈酷。

大傷痰涎如湧。

石菖蒲

能開心竅。心竅開則痰涎直入其中。永無出路。

半夏

此藥雖能降逆開結。但與膽星同用。未免助紂為虐。

秦艽

羌活

釣鈞藤

天麻

羚羊

防風

上已

六味雖風證所不忌。但無要藥。以
 主。持之。亦徒成糟粕。無用之物。
 真者難得。然亦。天竺黃
 治火。痰之標品。殭蠶雖祛風之正藥。
 牛黃雖為風痰之妙藥。然與膽南星石菖
 蒲枳殼同用。則反引痰入於心。竅。驛
 之。弗。出矣。竹瀝以薑汁和之。雖能驅經絡之
 氣。之。輸。布。反。致。寒。中。敗。胃。之。患。
 長。君。子。道。消。亦。無。如。之。何。矣。
 甘草雖為元老之才。但與諸藥同用。小人道

已上諸品。或作一方。或分作二三方。患者
 誤服之。輕者致重。重者即死。即倖免於死。

亦必變為癡呆及偏枯無用之人矣戒之戒之

虛癆方

歸脾湯 此方為補養後天第一藥。治食
少不眠怔忡吐血下血大便或溇或秘妄
夢健忘七情所傷遺精帶濁及女子不月
等證

炙薺三錢

人參

白朮蒸

棗仁炒黑

當歸身

茯神

龍眼肉

各二錢

木香

五分

炙草

一錢

遠志

五分
去心

水三杯煎八分溫服○高鼓峰去木香加

白芍一錢五分甚妙○咳嗽加麥冬二錢

五味七分○鬱氣加貝母二錢○脾虛癆

熱加丹皮梔子

六味地黃丸 壯水之主以制陽光凡一切

吐血下血咳嗽不眠骨蒸遺精淋濁屬於

陰虛者無不統治之

熟地

兩八

山茱肉

懷山藥

各四兩

丹皮

茯苓

澤瀉

各三兩

研末煉蜜丸如桐子大晒乾每服三錢淡

鹽湯送下一日兩服○加五味子名都氣

丸○加麥冬名八仙長壽丸治咳嗽○本

方改兩為錢水煎服名六味地黃湯

八味地黃丸

益火之源以消陰翳治腰膝

無力飲食不進腫脹疝瘕陽痿遺精帶濁
屬於元陽虛者無不統治之

即六味丸加附子

肉桂

各一兩

○本方去

附子名七味丸能引火歸源○本方去附

子加五味子名加減八味丸治大渴不止

○本方加牛膝車前子名濟生腎氣丸俗名

金匱腎氣丸

治水腫喘促○本方減兩為錢水

煎服名八味湯

小建中湯

仲景

此方為治虛癆第一方。今人不

講久矣。凡癆證必有蒸熱。此方有薑桂以扶心陽。猶太陽一出。則熾火無光。即退熱法也。凡癆證必飲食日少。此方溫脾。即進食法也。凡癆證必咳嗽。此方補土以生金。即治嗽法也。凡癆證多屬腎虛。此方補脾以輸精及腎。所謂精生於穀也。今人不能讀仲景書。反敢侮謗聖法。徒知生脉六味。

八味歸脾補中及款冬貝母玉竹百合蘇
陳醬地黄炭之類互服至死誠可痛恨

生白芍

三錢

桂枝

一錢五分

炙草

一錢

加生薑一錢五分大棗二枚水二杯煎八
分入飴糖三錢五分烱服○加黃耆二錢
名黃耆建中湯治虛癆諸不足飽悶者去
大棗加茯苓二錢氣逆者加半夏一錢五
分○此方人參當歸白朮俱隨宜加之

金匱炙甘草湯

肺燥肺痿咽痛脉代等證

生地

錢四

桂枝木

錢一

阿膠

錢一
五分

炙草

二錢

人參

錢一

麥冬

二錢
五分

棗仁

原方火
麻仁一

錢五

分

加生薑一錢大棗二枚水二杯酒半杯煎

八分服

喻嘉言清燥救肺湯

治燥氣鬱而成癆

桑葉

經霜者去
蒂三錢

人參

錢一

石膏

二錢三
分研

杏仁去皮尖一錢二分 甘草一分 麥冬一錢

枇杷葉去毛蜜炙一錢三分 黑芝麻一錢五分

水二杯半煎八分熱服○痰多加貝母三

錢○或加梨汁半盞

金匱薯蕷丸 治虛勞諸不足風氣百疾

薯蕷三十 當歸 桂枝 麴 乾地黄

豆黃卷各十 甘草二十 人參 阿膠

各七 芍藥 白朮 麥冬

杏仁

防風

各六分

柴胡

桔梗

茯苓

各五分

乾薑

三分

白朮

二分

大棗

百枚為膏

分

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空

腹酒服一九一百丸為劑錢半為一分

金匱大黃蠱虫丸 治五勞虛極羸瘦腹滿

不能飲食食傷憂傷房室傷飢傷勞傷經

絡榮衛傷內有乾血肌肉甲錯目黯黑緩

中補虛

大黃十分

黃芩二兩

甘草三兩

桃仁一升

杏仁一升

芍藥四兩

乾漆一兩

乾地黄一兩

蟲出一升

水蛭百個

蟬蟪一升

麤虫半升

右十二味末之煉蜜丸如小豆大酒服五

丸日三服

愚按以蒐血之品為補血之用仿於內經

四烏鱗骨一蘆茹丸張路玉以此丸藥料

及鮑魚入絨毛雞腹內黃酒童便煮爛汁

乾。將雞去骨取肉。同諸藥。懸火上烘乾。為末。加煉蜜為丸。每服二錢。以黃酒送下。日三服。代麤虫丸甚妥。

咳嗽諸方

六安煎

景岳

治外感咳嗽

半夏

二錢

陳皮

一錢五分

茯苓

二錢

甘草

一錢

杏仁

二錢

皮尖去

白芥子

一錢炒研

加生薑七片水煎服。寒甚加細辛七分。

○愚每用必去白芥子加五味子乾薑細辛

小青龍湯 治一切咳嗽

方見傷寒○方中隨寒熱虛實加減唯細辛乾薑五味三藥不去讀金匱者自知

加減小柴胡湯 治發熱咳嗽

柴胡四錢 半夏二錢 黃芩 炙草各一錢五分

乾薑一錢 五味子八分

水二杯半煎一杯半去滓再煎八分溫服一日二服

五味子湯金治傷燥欬唾中有血牽引胃脇

痛皮膚乾枯

五味子五分

桔梗 甘草 紫苑茸

續斷 竹茹 桑根皮各一錢

生地黃二錢

赤小豆一撮即赤豆之細者

右九味水煎空心服秘旨加白蜜一匙

愚按赤豆易生偏豆五錢圓圓不研最能
退熱補肺但有寒熱往來忌之○去績斷
赤豆地黃加歲疑門
冬乾薑細辛亦妙

麥門冬湯金治大病後火熱乘肺欬唾有血

胸膈脹滿上氣羸瘦五心煩熱渴而便秘

麥門冬二錢 桔梗 桑根皮 半夏

生地黃 紫苑茸 竹茹各一錢 麻黃七分

甘草五分 五味子十粒 生薑一片

右十一味水煎空心服

瘡疾方

小柴胡湯方見傷寒一切瘡病俱治

痢證方

芍藥湯 行血則膿血自愈調氣則後重自

除三日內俱可服

白芍 當歸各一錢五分 黃連 黃芩各一錢二分

分桂 檳榔一錢 木香六分 甘草四分

大黃一錢虛人不用 厚朴一錢炙 枳殼一錢

青皮五分

水二杯煎八分溫服。小便不利加滑石
澤瀉。滯澁難出虛者倍歸芍實者倍大
黃。紅痢加川芎桃仁。

人參敗毒散。喻嘉言最重此方。令微汗則
陽氣升而陷者舉矣。此法時醫不講。余每
用此方加陳倉米四錢。或加黃芩黃連。必
用屢效。

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

枳殼

茯苓

桔梗

人參

已上各一錢

甘草

五分

水二杯加生薑三片煎七分服○加倉米

名倉廩湯治噤口痢

心腹痛及胸痺方

烏梅丸

方見傷寒

治蟲痛

蘇合香丸

治注痛

拙著從衆錄有方論。○又鬼注不去。宜虎骨。鹿茸。羚羊角。龍骨。各三錢。以羊肉湯煎。入麝香少許服。取腥羶之味。引濁陰之氣。從陰而泄。此喻嘉言寓意草法也。

香蘇飲

治氣痛。○一切感冒俱佳。

香附

二錢

紫蘇葉

三錢

陳皮

甘草

各一錢

加生薑五片。水二杯。煎八分服。○心痛加

元胡索二錢。酒一盞。

七氣湯

亦名四七湯

治七情之氣鬱逆

半夏 厚朴

茯苓

各三錢

紫蘇葉

一錢

加生薑三片水二杯煎八分服

百合湯

治心口痛諸藥不效○亦屬氣痛

百合

一兩

烏藥

三錢

水三杯煎八分服○此方余自海壇得來

失笑散

治一切血滯作痛如神

五靈脂

醋炒

蒲黃

各一兩

共研末每服三錢以醋湯送下日二服

桃仁承氣湯

治心腹痛大便不通其人如

狂屬死血

桂枝

二錢

桃仁

十七枚
去皮尖

大黃

四錢

芒硝

七分

甘草

七分

水二杯煎八分去滓入硝二沸溫服

丹參飲

治心胸諸痛神驗婦人更宜○亦

屬血痛○亦可通治諸痛

丹參二兩

白檀香

要真者極香的切片

砂仁各一錢

水二杯煎八分服

妙香散

方見遺精

平胃散

治一切飲食停滯

蒼朮

厚朴炒

陳皮

各二錢

甘草

一錢

加生薑五片水二杯煎八分服○肉積加

山查○麴積加麥芽萊服子○穀積加穀

芽○酒積加葛根砂仁

二陳湯

方見中風

十棗湯

治水飲作痛峻劑不可輕用

大戟

芫花炒

甘遂

各等分研末

用大棗十枚水二杯煎七分去滓入藥方

寸匕

約有七分

服次早當下未下再一服服後

體虛以稀粥調養

理中湯

方見傷寒

治冷痛

吳茱萸湯

仲景

治冷痛。通治食穀欲嘔頭痛

如破煩躁欲死者及大吐不已之證

吳茱萸

湯泡二錢五分

人參一錢五分

大棗五枚

生薑

五錢切片

水二杯煎八分溫服

金鈴子散

治心口痛及脇痛腹痛如神○

屬熱者

金鈴子

去核

元胡索

各二兩研末

每服三錢黃酒送下

厚朴三物湯金匱治心腹實痛大便閉者

厚朴四錢 大黃二錢 枳實一錢五分

水二杯煎八分溫服

厚朴七物湯金匱即前方加桂枝甘草

一錢五分 生薑二錢五分 大棗二枚

水二杯煎八分服○嘔者加半夏一錢○

寒多者加生薑一錢五分

附子粳米湯金匱治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇

逆滿嘔吐

附子

二錢

半夏

四錢

炙草

一錢

粳米

五錢

布包

大棗

二枚

水三杯煎八分溫服日夜作三服

大黃附子湯

金匱

脇下偏痛發熱脉緊弦者

大黃

附子

各三錢

細辛

二錢

水二杯煎八分服

當歸生薑羊肉湯

金匱

治心腹諸痛虛極諸藥

不效者一服如神及脇痛裏急婦人產後

腹中疝痛

當歸

七錢五分

生薑

一兩二錢五分

羊肉

四兩去筋膜用

藥戥

秤

方準

水五杯煎取二杯溫服一杯一日兩服○

若寒多者加生薑五錢○痛多而嘔者加

橘皮五錢白朮二錢五分

括樓薤白白酒湯

金匱

治胸痺喘息欬唾胃背

痛寸沉遲關上小緊

栝樓

連皮子搗五錢

薤白

如乾者用三錢生者用六錢

白酒三杯煎八分服○加半夏二錢名栝

樓薤白半夏湯治胸痺不得卧心痛徹背

大建中湯

金匱

治胃大寒痛嘔不能飲食腹中

寒上衝皮起出見有頭足上下痛不可觸

近

川椒

二錢微炒出汗

乾薑

四錢

人參

三錢

水二鐘煎一鐘去滓入膠飴四錢煎取八分溫服如一炊頃可食熱粥半碗

隔食反胃方

左歸飲景岳即六味湯去丹皮澤瀉加枸杞炙

草

啟隔飲悟心治食入即吐

川貝母一錢五分沙參三錢丹參二錢

川鬱金五分乾荷蒂三個砂仁殼四分

杵頭糠

三錢布包

茯苓

一錢五分

石菖蒲

四分

水二杯煎一杯服

大半夏湯

金匱治胃反

人參

二錢

半夏

俗用明礬製者不可用只

清水浸三日

起蒸熱切片晒乾四錢

換一換

長流水

入蜜揚二百四十遍取二杯半煎

七分服

吳茱萸湯

方見心腹

六君子湯

此方為補脾健胃祛痰進食之

通劑百病皆以此方收功

人參

白朮

炒

茯苓

半夏

各二錢

陳皮

炙草

各一錢

加生薑五片大棗二粒水二杯煎八分服

○治反胃宜加附子二錢丁香藿香砂仁

各一錢

附子理中湯

治反胃

即理中湯加附子三錢。治反胃宜加茯苓四錢甘草減半。

附隔食方法

人鏡經曰。內經云。三陽結謂之隔。蓋足太陽膀胱經水道不行。手太陽小腸經津液枯槁。足陽明胃經燥糞結聚。所以飲食拒而不入。縱入太倉。還出喉嚨。夫腸胃一日一便。乃常度也。今五七日不便。陳物不去。

新物不納。宜用三一承氣湯。即次下之後。而脂麻飲。啜之。陳莖去。而腸胃凜藏。痰盡。而營衛昌。飲食自進矣。

三一承氣湯

大黃 芒硝 甘草 厚朴 枳實 各一錢

水二杯煎八分服。按此方太峻。姑存之。以備參考。

氣喘方

蘇子降氣湯

治上盛下虛氣喘等證

紫蘘子

二錢 微炒

前胡

當歸

半夏

陳皮

厚朴

各一錢

沉香

炙草

各五分

加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

葶藶大棗瀉肺湯

金匱

治支飲滿而肺氣閉氣

閉則呼吸不能自如用此苦降以泄實邪

葶藶子

隔紙炒研如泥二錢二分

水一杯半大棗十二枚煎七分入葶藶服

之

十棗湯

方見心腹痛

小青龍湯

方見傷寒

貞元飲

景岳陰血

為陽氣之依歸血虛則氣無

所依時或微喘婦人血海常虛多有此證

景岳方意在濟之緩之四字濟之以歸地

緩之以甘草頗有意義今人加紫石英黑

鉛之重鎮則失緩之之義加沉香白芥子

之辛香則失濟之之義矣。且此方非為元氣奔脫而設。時醫每遇大喘之證。必以此方大劑與服。氣升則火升。偶得濡潤之藥。氣亦漸平。一晌旋而陰柔之性與飲水混為一家。則胸膈間純是陰霾之氣。其人頃刻歸陰矣。吾鄉潘市醫倡此法。以局人神智。無一人悟及。誠可痛恨。

熟地黃

五七錢或一二兩

當歸身

三四錢

炙草

一二

三錢

水三四杯煎八分服

苓桂術甘湯金匱治氣短。○喻嘉言云此治呼

氣短

茯苓

四錢

白朮

桂枝

各二錢

炙草

一錢五分

水二杯煎八分服

腎氣丸

金匱

治氣短。○喻嘉言云此治吸氣短

即八味地黃丸但原方係乾生地黃桂枝

茯苓甘草大棗湯

仲景

治氣喘臍下動氣欲作

奔豚

茯苓

六錢

桂枝

甘草

炙各二錢

大棗四枚

用甘瀾水三杯半先煎茯苓至二杯入諸藥煎七分服○作甘瀾水法取長流水揚之數百遍或千遍愈妙

真武湯

鎮水逆定痰喘之神劑

方見傷寒○宜倍茯苓○咳嗽甚者去生

薑加乾薑一錢五分五味細辛各一錢

黑錫丹 治脾腎虛冷上實下虛奔豚五種
水氣中風痰潮危急

喻嘉言曰。凡遇陰火逆冲。真陽暴脫。氣喘
痰鳴之急證。舍此方。再無他法。可施。予每
用小囊佩帶隨身。恐遇急證。不及取藥。且
欲吾身元氣。溫養其藥。藉手效靈。厥功歷
歷可紀。即痘症倒靨逆候。服此亦可回生。

沉香

附子

炮

胡蘆巴

肉桂

各五錢

小茴香

補骨脂

肉豆蔻

木香

金鈴子

去核各一兩

硫黃

黑鉛

與硫黃炒成砂子各

三兩

右為末酒煮麴糊丸梧子大陰乾以布袋擦令光瑩每服四五十丸薑湯送下

血證方

麻黃人參芍藥湯

東垣

治吐血外感寒邪內虛

蘊熱

桂枝五分補表虛

麻黃去外寒

黃芪實表益衛

炙甘草補脾

白芍安太陰入

參益元氣而實表

麥冬補肺氣各三分

五味子五粒安肺氣

當歸五分

養血和血

水煎熱服。○按此方以解表為止血。是東

垣之巧思。倖中。非有定識也。觀其每味自

注藥性。俱悖聖經。便知其陋。

甘草乾薑湯

金匱

炙甘草

四錢

乾薑

炮二錢

水二杯煎八分服

栝葉湯

金匱

治吐血不止

栝葉

生用三錢無生者用乾者二錢

乾薑

一錢

艾葉

生用

二錢如無用乾者一錢

水四杯取馬通二杯煎一杯服

○如無馬

通以童便二杯煎八分服

黃土湯

金匱

治先便後血為遠血。○亦治衄血

吐血不止

桂心黃土

八錢原方四錢

生地

黃芩

甘草

阿膠

白朮

附子

炮各一錢五分

水三杯煎八分服

赤小豆散

金匱

治先血後便為近血

赤小豆

浸令出芽晒乾一兩

當歸

四錢

共研末每服三錢漿水下

即洗米水三日後有酸味是也

按凡止血標藥可隨宜作引。血餘灰可用一

煎諸血。○梔子。茜草。乾側柏。治上血。槐花

皆驗。○生地。榆。烏梅。續斷。治血崩。○凡下血及血痢。

口渴後重。脉洪有力者。為火盛。可用苦參。

子去殼。仁勿破。外以龍眼肉包之。空腹以

倉米湯送下。九粒。一日二三服。漸加至十

四粒。二日效。

水腫方

五皮飲

此方出華元化中藏經以皮治皮

不傷中氣。所以為治腫通用之劑。

大腹皮

洗酒

桑白皮

生各二錢

雲苓皮

四錢

陳皮

二錢

生薑皮

一錢

水三杯煎八分溫服。上腫宜發汗加紫

蘇葉荊芥各二錢防風一錢杏仁一錢五

分。下腫宜利小便加防已二錢木通赤

小豆各一錢五分。喘而腹脹加生萊菔

子杏仁各二錢○小便不利者為陽水加
赤小豆防已地膚子○小便自利者為陰
水加白朮二錢蒼朮川椒各一錢五分○
熱加海蛤三錢知母一錢五分○寒加附
子乾薑各二錢肉桂一錢○嘔逆加半夏
生薑各二錢○腹痛加白芍二錢桂枝一
錢炙甘草一錢

導水茯苓湯

治水腫頭面手足遍身腫如

爛瓜之狀按而塌陷胸腹喘滿不能轉側
安睡飲食不下小便秘澀溺出如割或如
黑豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者
用此即漸利而愈

澤瀉

赤茯苓

麥門冬

去心

白朮

各三兩

桑白皮

紫蘇

檳榔

木瓜

各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

各七錢五分

右咬咀每服一二兩水二杯燈草三十根

煎八分食遠服。○如病重者可用藥五兩
又加麥冬及燈草半兩以水一斗於砂鍋
內熬至一大碗再下小鉋內煎至一鍾五
更空心服

加減金匱腎氣丸

治脾腎兩虛腫勢漸大

喘促不眠等證

熟地

四兩

雲白苓

三兩

肉桂

牛膝

丹皮

山藥

澤瀉

車前子

山茱肉

各一
兩 附子 五錢

研末煉蜜丸如桐子大每服三錢燈草湯送下一日兩服○以兩為錢水煎服名加減金匱腎氣湯○但附子必倍用方效○加川椒目一錢五分巴戟天二錢治脚面腫風水因風而病水也

防已黃耆湯金匱治風水脉浮身重汗出惡風

防已 三錢

炙草 一錢五分

白朮 二錢

黃耆 三錢

生薑

片四

大棗

粒一

水二杯煎八分服服後如蟲行皮中從腰
下如冰後坐被上又以一被繞腰下溫令
微汗瘥○喘者加麻黃○胃中不和者加
芍藥○氣上衝者加桂枝

虛汗自出故不用麻黃以散之只用防已
以驅之服後身如蟲行及腰下如冰云云
皆濕下行之徵也然非耆朮甘草焉能使

衛氣復振而驅濕下行哉。

越婢湯

金匱

治惡風一身悉腫脉浮不渴續自

汗出無大熱者

麻黃

六錢

石膏

八錢

甘草

二錢

生薑

三錢

大棗

五粒

水四杯先煮麻黃至三杯去沫入諸藥煎

八分服日夜作三服○惡風者加附子一

錢○風水加白朮四錢

前云身重為濕多。此云一身悉腫為風多。風多氣多熱亦多。且屬急風。故用此猛劑。

杏子湯 脉浮者為風水。發其汗即已。方闕。

或云即甘草麻黃湯加杏仁。

皮水

水行于皮中也。其脉浮外證跗腫。

曰其腹如鼓者。曰不惡風者。不兼風也。曰不渴者。病不在內也。曰當發其汗者。

以水在皮。宜汗也。

防已茯苓湯

金匱

治四肢腫。水在皮中。聶聶動。

者

防已

桂枝

黃耆

各三錢

茯苓

六錢

炙草

錢一

水三杯煎八分服日夜作三服

藥亦同防已黃耆湯但去朮加桂苓者風水之濕在經絡近內皮水之濕在皮膚近外故但以苓協桂滲周身之濕而不以朮燥其中氣也不用薑棗者濕不在上焦之

營衛無取乎宣之也。

蒲灰散

金匱

厥而為皮水者此主之

腫甚而漬之逆證厥

之為言

逆也

蒲灰

半斤

滑石

一斤

為末飲服方寸匕日三服。○愚按當是外

敷法然利濕熱之劑亦可內服外糝也。

越婢加朮湯

金匱

裏水此主之甘草麻黃湯亦

主之。○按裏水當是皮水筆誤也或水在

皮裏即皮水之重者亦未可知

方見風水

甘草麻黃湯

麻黃

錢四

甘草

錢二

水二杯先煮麻黃至一杯半去沫入甘草

煮七分服重覆汗出不汗再服慎風寒

二藥上宣肺氣中助土氣外行水氣

正水

水之正狀也其脉遲者水屬陰也
外證自喘者陰甚于下不復與胸

中之陽氣相調。水氣格陽而喘也。其目
窠如蠶。兩脰腫大。諸證金匱未言。無不

見俱

愚按正水。金匱未出方。然提綱云。脉沉遲。
外證自喘。則真武湯。小青龍湯。皆正治之。
的方。越婢加附子湯。麻黃附子湯。亦變證
之備方。桂甘麻辛附子湯。加生桑皮五錢。
黑豆一兩。為窮極之巧方。此正水之擬治
法也。

石水

謂下焦水堅如石也其脉自沉外證少腹滿不喘

麻黃附子湯

麻黃

三錢

炙草

二錢

附子

一錢

水二杯先煮麻黃至一杯半去沫入諸藥

煎七分服日作三服

此即麻黃附子甘草湯分兩畧異即以此溫

經散寒之法變為溫經利水之妙

黃汗

汗出沾衣而色黃也汗出當風所致汗與水邪傷心或汗出當風所致汗與水

皆屬水氣因其入而內結則鬱熱而黃其脉沉而遲外證身發熱四肢頭面腫久不愈必致癰膿

黃耆桂枝芍藥苦酒湯金匱治身體腫發熱汗

出而渴狀如風水汗出沾衣色正黃如檗

汁脉自沉風水脉浮以汗出入水中浴水

從毛孔入得之故水氣從毛孔入而傷其心

搏結而脉沉也凡看書宜活看此證亦有

從酒後汗出當風所致者雖無外水而所

出之汗因風內返亦是水凡脾胃受濕濕

久生熱濕熱交蒸而成黃皆可以汗出入

水之意

悟之

黃耆

錢五

芍藥

桂枝

錢各三

苦酒一杯半水一杯煎八分溫服當心煩

至六七日乃解汗出于心苦酒止之太急

邪自

退也

桂枝加黃耆湯金匱黃汗之病兩脰自冷盜汗

出汗已反發熱久久身必甲錯發熱不止

者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久

必身胸膈即胸中痛又從腰已上汗出下
無汗腰腕弛痛如有物在皮中狀癢者不
能食身疼重煩躁小便不利之變已上皆黃汗
證師備
擬之以立治法茲因集此為黃汗雖多而
證
隘不能全錄只輯其要此為黃汗
其源總由水氣傷心所致結
此一句見治法不離其宗

桂枝

芍藥

生薑

甘草

炙

黃耆

錢各二

大棗

枚四

水三杯煮八分溫服須臾啜熱粥一杯餘

以助藥力。溫覆取微汗。若不汗更服。
前方止汗。是治黃汗之正病法。此方令微
汗。是治黃汗之變證法。

脹滿蠱脹方

七氣湯

方見心腹

治實脹屬七情之氣者

胃苓散

消脹行水

蒼朮

一錢五分炒

白朮

厚朴

各一錢五分

桂枝

一錢

陳皮

澤瀉

猪苓

各一錢五分

一錢

炙草

七分 茯苓 錢四

加生薑五片水三杯煎八分服○去桂草
以煨半熟蒜頭搗為丸陳米湯下三四錢
一日兩服更妙

三物厚朴湯 七物厚朴湯 二方便見腹痛

桂甘薑棗麻辛附子湯 金治氣分心下堅大

如蠶邊如旋盃

桂枝 生薑 各三錢 甘草 麻黃 細辛

各二錢

附子

錢一

大棗

枚三

水三杯。先煮麻黃至二杯。去沫。入諸藥。煎八分。溫服。日夜作三服。當汗出如虫行皮中。即愈。

此證是心腎交病。上不能降。下不能升。日積月累。如鐵石難破。方中桂甘薑棗以和其上。而復用麻黃附子細辛少陰的劑。以治其下。庶上下交通。而病愈。所謂大氣一

轉其氣乃散也

枳朮湯

金匱

治心下堅大如盤

如盤而不知盃

雖堅大而水飲所作形以辛甘散之

形以苦泄之

枳實

錢二

白朮

錢四

水二杯煎八分服日夜作三服腹中硬即止

禹餘糧丸三因治十腫水氣脚膝腫上氣喘急

小便不利但是水氣悉皆主之許學士及

此方治臟

蛇含石燒蛇者三兩以新鐵銚盛入炭火中

黃傾入醋中候禹餘糧石三真針砂

冷取出研極細

五兩先以水淘淨炒乾入餘糧一處用米

醋二升就銚內煮醋乾為度後用銚并藥

入炭中燒紅銚內出傾藥

淨磚地上候不研細

以三物為主其次量入虛實入下項治水

轉輸此方三物既非大戟甘遂芫花之比

又有下項藥扶持故座人老人亦可服

三字經

卷三

十

羌活

木香

茯苓

川芎

牛膝

酒浸

桂心

蓬朮

附子

乾薑

炮青皮

白豆蔻

炮

大茴香

炒

京三稜

炮

白蒺藜

當歸

酒浸一宿
各半兩

右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅拭去水
和藥再杵極勻丸如桐子大食前溫酒白
湯送下三十九至五十九最忌鹽一毫不
可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小

便內旋去不動臟腑病去日日三服兼以
溫和調補氣血藥助之真神方也
此方昔人用之屢效以其大能煖水藏也
服此丸更以調補氣血藥助之不為峻也

暑證方

六一散河治一切暑病

滑石

六兩

甘草

一兩

研末每服三錢井花水下或燈草湯下

白虎湯

仲景

治傷暑大渴大汗之證

方見傷寒○加人參者以暑傷元氣也○
加蒼朮者治身熱足冷以暑必挾濕也

香薷飲

治傷暑發熱身疼口燥舌乾吐瀉

甘草

一錢

厚朴

一錢五分

扁豆

二錢

香薷

四錢

水二杯煎八分冷服或溫服○瀉利加茯苓

苓白朮○嘔吐加半夏○暑氣發搐加羌

活秦艽

大順散

治陰暑即畏熱貪涼之病

乾薑

一錢炒

甘草

八分炒

杏仁

去皮尖六分炒

肉桂

六分

共為末每服三錢水一杯煎七分服○如

煩躁井花水調下一錢半

生脉散

却暑良方

生

人參

一錢

麥冬

三錢

五味

一錢

水一杯半煎七分服

清暑益氣湯

東垣

炙耆

一分錢五分

人參

白朮

蒼朮

青皮

陳皮

麥冬

猪苓

黃柏

各五分

乾葛

澤瀉

各一錢

神麴

八分

五味

炙草

各三分

升麻

三分

加生薑三片大棗二枚水二杯煎七分服

一物底蒂湯

金匱

瓜蒂

二十個

水二杯煎八分服

泄瀉方

胃苓散 方見脹滿○加減詳三字經小注

四神丸 治脾腎虛寒五更泄瀉

補骨脂

四兩酒炒

肉豆蔻

麩煨去油

吳茱萸 泡

五味

炒各二兩

用紅棗五兩生薑五兩同煮去薑將棗去

皮核搗爛為丸如桐子大每日五更服三

錢臨臥服三錢米湯下。○加白朮附子罌粟人參更效。

生薑瀉心湯 黃連湯 甘草瀉心湯

半夏瀉心湯 乾薑黃芩黃連人參湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯已上六方俱見傷寒論讀

按已上諸法與內經中熱消癰則便寒寒中之屬則便熱一節。揆脉證而擇用甚驗。張石頑醫通載之甚詳。但古調不彈久矣。

余新悟出一方。有瀉心之意。上可消痞。下
可止瀉。腸熱胃寒。能分走而各盡其長。非
有他方。即傷寒厥陰條之烏梅丸也。屢用
屢驗。